

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



2



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

3

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

**Furaj pentru păsări  
de curte**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj Central intenziv de start broiler 5% complex premix cu kokcidiostaticum**

Furaj complementar

Numar articol: 412-115-01

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente,  
Conține sulfat de cupru!

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	5.3 %	Cu	300.0 mg/kg
Lizin	2.5 %	Fe	780.0 mg/kg
Methionin	3.3 %	Mn	2 400.0 mg/kg
Ca	19.1 %	Se	9.0 mg/kg
P	4.5 %	Vitamina A	200 000.0 NE/kg
Mg	5.0 %	Vitamina D3	140 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamina E	1 500.0 mg/kg
Zn	1 950.0 mg/kg	Vitamina-K3	100.0 mg/kg
		Salinomycin-Na	1 200 mg/kg

Produsul conține în continuare vitamine B și antioxidanși.

În furajul preparat este adăugat și produs de medicină veterinară:

Salinomax

Nr de identificare: E766

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă pentru consum uman

**Timp de așteptare sanitară: 5 zi**

### INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând în proporție de 5% în furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din ziua 1-a până la al 10-lea zi, adăugarea după pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



**Furaj Central intenziv  
broiler pentru creștere 4%  
complex premix  
cu kokcidiostaticum**

Furaj complementar

**Numar articol: 412-124-01  
Greutate netă: 20kg**

**Compoziție:**

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente,

**Conține sulfat de cupru!**

**CONȚINUT INTERN**

Umezeală	5.4 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.1 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.8 %	Se	11.2 mg/kg
P	3.1 %	Vitamina A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamina D3	175 000.0 NE/kg
Na	4.4 %	Vitamina E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Vitamina-K3	125.0 mg/kg
Cu	375.0 mg/kg	Salinomycin-Na	1 500 mg/kg

Produsul conține în continuare vitamine B și antioxidanți.

În furajul preparat este adăugat și produsul de medicină veterinară:

Salinomax

Nr de identificare: E766

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă pentru consum uman

Timp de așteptare sanitară: 5 zi

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând în proporție de 4% în furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din al 11-lea zi până în al 35-a zi după pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj central intenziv broiler pentru încheiere 4% complex premix**

Furaj complementar  
Numar articol: 412-134-01

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente

**Conține sulfat de cupru!**

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	5.4 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	1.8 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.8 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.6 %	Se	11.2 mg/kg
P	3.3 %	Vitamina A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.3 %	Vitamina D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamina E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Vitamina K3	125.0 mg/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând în proporție de 4% în furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din al 35-ea zi până în al 42-lea zi (tăiere), după pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj central extra pentru găini ouătoare 4% complex premix**

Furaj complementar  
Numar articol: 412-144-01

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente  
Conține sulfat de cupru!

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	6.1 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	2.9 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.3 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.4 %	Se	11.2 mg/kg
P	0,1 %	Vitamina A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamina D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamina E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Fitáz	12 500.0 FTU/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat in furajul pasărilor ouătoare in proporție de 4%, începând din săptămâna 16 pînă in săptămâna 52, alimentare după tehnologie

**Termen de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Furaj central extra pentru găini ouătoare 4% complex premix cu fitaz și colorant de ouă**

Furaj complementar  
Numar articol: 412-154-01

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

var furajer, făină de grâu furajeră, sare furajeră, MCP,  
preamestec de vitamină și microelemente  
Conține sulfat de cupru!

### CONTINUT INTERN

Umezeală	6.1 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	2.9 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.3 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.4 %	Se	11.2 mg/kg
P	0.1 %	Vitamina A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamina D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamina E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Fitáz	12 500.0 FTU/kg

In continuare produsul conține și vitamine B și antioxidanți și coloranți de ouă

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Amestecat in furajul pasarilor ouătoare in proporție de 4%, începând din săptămâna 16 pînă in săptămâna 52, alimentat după tehnologie  
Produsul conține și coloranți de ouă (13 nuanțe)

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat de furaj Extra pentru găini ouătoare 35%

Furaj complementar

Numar articol: 933-130-00

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compoziție:

preamestec de soia extrahată, tocătura de rapiță extrahată, floarea soarelui extrahată, var furajer, MCP, preamestec, ouă de colorat

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.7 %
AME găini	5.9 MJ/kg	Lizin	1.6 %
Poteine brută	25.9 %	Methionin	0.7 %
Grăsime brută	1.4 %	Vitamina A	24 000.0 NE/kg
Fifre crudă	8.0 %	Vitamina D3	6 000.0 NE/kg
Cenușă brută	36.2 %	Vitamina E	100.0 mg/kg
Na	0.4 %	Cu	15.5 mg/kg
Ca	10.9 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Prepararea furajului al puilor ouător în proporție de 35%, începând din al 16 săptămână până în al 52 săptămână, în perioada de producerea de ouă.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Concentrat de furaj intensiv de start broiler pentru 40% cu kokcidostaticum**

Furaj complementar

Numar articol: 935-210-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compozitie:

soiă extrahată, sulfat de soia, gluten de porumb, var furajer, MCP,  
preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.6 %
AME găini	9.9 MJ/kg	Lizin	2.6 %
Poteine brută	38.5 %	Methionin	0.9 %
Grăsime brută	6.1 %	Vitamina A	35 000.0 NE/kg
Fifre crudă	4.3 %	Vitamina D3	12 500.0 NE/kg
Cenușă brută	14.4 %	Vitamina E	125.0 mg/kg
Na	0.4 %	Cu	40.7 mg/kg
Ca	2.5 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin - Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând in proporție de  
40% in furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din ziua 1-a  
pînă la al 10-12 zi, adăugarea după pofta de mâncare.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Concentrat de furaj intensiv de broiler pentru creștere 30% cu kokcidiostaticum**

Furaj complementar

Numar articol: 935-220-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compozitie:

soiă extrahată, sulfat de soia, var furajer, MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.2 %
AME găini	9.1 MJ/kg	Lizin	2.4 %
Poteine brută	39.9 %	Methionin	1.0 %
Grăsime brută	3.5 %	Vitamina A	46 760.0 NE/kg
Fifre crudă	4.5 %	Vitamina D3	16 700.0 NE/kg
Cenușă brută	14.3 %	Vitamina E	167.0 mg/kg
Na	0.5 %	Cu	50.7 mg/kg
Ca	2.8 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preparat este adăugat și produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6%  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin - Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând în proporție de 30% în furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din al 11-lea zi până în al 35-a zi după pofta de mâncare

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat de furaj intenziv de broiler pentru încheiere 30%

Furaj complementar

Numar articol: 935-230-10

Greutate netă: 5 kg și 20kg

### Compoziție:

soiă extrahată, sulfat de soia, floarea soarelui extrahată, var furajer,  
MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.1 %
AME găini	9.3 MJ/kg	Lizin	2.1 %
Poteine brută	31.9 %	Methionin	1.0 %
Grăsime brută	6.2 %	Vitamina A	46 760.0 NE/kg
Fifre crudă	6.5 %	Vitamina D3	16 700.0 NE/kg
Cenușă brută	14.1 %	Vitamina E	167.0 mg/kg
Na	0.5 %	Cu	47.3 mg/kg
Ca	2.4 %		

### INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor puilor broiler: amestecând în proporție de 30% în furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Din al 35-ea zi până în al 42-lea zi (tăiere), după pofta de mâncare.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Concentrat de furaj intenziv de start pentru curci 50% cu kokcidiostaticum**

Furaj complementar

Numar articol: 935-510-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compozitie:

soia extrahată, sulfat de soia, gluten de porumb, var furajer, MCP,  
preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.1 %
AME găini	9.9 MJ/kg	Lizin	2.5 %
Poteine brută	42.9 %	Methionin	1.0 %
Grăsime brută	3.9 %	Vitamina A	30 240.0 NE/kg
Fifre crudă	4.1 %	Vitamina D3	6 720.0 NE/kg
Cenușă brută	11.4 %	Vitamina E	112.0 mg/kg
Na	0.3 %	Cu	30.4 mg/kg
Ca	1.9 %	Robenidin	66.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin - Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru obținerea furajelor pentru curci amestecând in proporție de  
50% in furajul final. Mod de folosire al furajului finit: Pentru curcile  
de casă pînă in săptămâna 6.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Concentrat de furaj intenziv de creștere pentru curci 40%** cu kokcidiostaticum

Furaj complementar

Numar articol: 935-520-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compozitie:

soiă extrahată, sulfat de soia, var furajer, MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.4 %
AME găini	9.3 MJ/kg	Lizin	2.7 %
Poteine brută	38.7 %	Methionin	1.0 %
Grăsime brută	4.7 %	Vitamina A	37 800.0 NE/kg
Fifre crudă	4.5 %	Vitamina D3	8 400.0 NE/kg
Cenușă brută	14.6 %	Vitamina E	140.0 mg/kg
Na	0.4 %	Cu	35.6 mg/kg
Ca	2.7 %	Robenidin	82.5 mg/kg

In furajul preparat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin - Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Prepararea furajului al curcile in proporție de 40%, de casă începând  
din săptămâna 6 pînă in săptămâna 10.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat de furaj intensiv de creștere pentru curci 30%

Furaj complementar

Numar articol: 935-530-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compoziție:

soiă extrahată, sulfat de soia, var furajer, MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.4 %
AME găini	9.1 MJ/kg	Lizin	2,5 %
Poteine brută	38.5 %	Methionin	1.6 %
Grăsime brută	4.5 %	Vitamina A	35 000.00 NE/kg
Fifre crudă	6.2 %	Vitamina D3	10 000.00 NE/kg
Cenușă brută	7.4 %	Vitamina E	167.00 mg/kg
Na	0.4 %	Cu	40.00 mg/kg
Ca	2.4 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Prepararea furajului al curcile in proporție de 30%, de casă începând din săptămâna 6 pînă in săptămâna 10.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Concentrat de furaj intenziv de incheiere pentru curci 30%

Furaj complementar

Numar articol: 935-540-10

**Greutate netă: 5 kg și 20kg**

### Compozitie:

soiă extrahată, floarea soarelui extrahată, full fat soiă, var furajer,  
MCP, preamestec

### CONTINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	1.5 %
AME găini	9.1 MJ/kg	Lizin	2.7 %
Poteine brută	36.3 %	Methionin	0.8 %
Grăsime brută	4.5 %	Vitamina A	35 000.00 NE/kg
Fifre crudă	12.0 %	Vitamina D3	10 000.00 NE/kg
Cenușă brută	9.2 %	Vitamina E	167.00 mg/kg
Na	0.5 %	Cu	40.00 mg/kg
Ca	3.2 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Prepararea furajului al curcile in proporție de 30%, de casă începând  
din săptămâna 16 pînă la tăiere.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj pentru start pui

Furaj complet

Numar articol: 935-110-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, grâu furajer, soiă extrahată, sulfat de soia, var furajer, MCP, tărâță de grâu, preamestec,

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
AME găini	12,1 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Poteine brută	18.5 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	3.5 %	Vitamina A	14 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.2 %	Vitamina D3	5 000.0 NE/kg
Cenușă brută	5.4 %	Vitamina E	50.0 mg/kg
Na	0.15 %	Cu	18.5 mg/kg
Ca	0.9 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă pentru consum uman  
Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furaj cu valoare totală pentru start de pui începând din al 14-a zi pînă  
in al 14-a săptămână, adăugare după pofta puilor

Timp de garanție: 90 zile  
A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj pentru creștere a puilor curcă

Furaj complet

Numar articol: 935-120-00

Greutate netă: 20kg

### Compoziție:

porumb furajer, grâu furajer, făină de grâu furajeră, soia extrahată, floarea soarelui extrahată, var furajeră, MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	0.7	%
AME găini	12.2	Mg/kg	Lizin	0.6	%
Poteine brută	15.2	%	Methionin	0.4	%
Grăsime brută	3.2	%	Vitamina A	14 000.0	NE/kg
Fifre crudă	4.2	%	Vitamina D3	5 000.0	NE/kg
Cenușă brută	5.1	%	Vitamina E	50.0	mg/kg
Na	0.14	%	Cu	14.1	mg/kg
Ca	0.8	%	Robenidin	33.0	mg/kg

In furajul preparat este adăugat și produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 % premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă pentru consum uman  
Timp de așteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furaj cu valoare totală pentru găinele tineri începând din al 14-a săptămână pînă în al 20-a săptămână, adăugare după pofta puilor

Timp de garanție: 90 zile

A se păstra în locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj extra ouător

Furaj complet

Numar articol: 935-130-00

Greutate netă: 20 kg

### Compoziție:

porumb furajer, tocătură de floarea soarelui, grâu furajer, tocătura de soiă exrtahată, gluten porumb, var furajer, MCP, preamestec,

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.8 %
AME găini	10.2 MJ/kg	Lizin	0.6 %
Poteine brută	15.8 %	Methionin	0.3 %
Grăsime brută	3.6 %	Vitamina A	10 023.0 NE/kg
Fifre crudă	4.5 %	Vitamina D3	2 600.0 NE/kg
Cenușă brută	17.8 %	Vitamina E	40.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	6.7 mg/kg
Ca	4.0 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Intre săptămâna 20 și 35 in timpul producției de vârf.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj ouător după perioada de vârf

Furaj complet

Numar articol: 935-140-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, făină de grâu furajeră, tocătură de floarea soarelui,  
grâu furajer, CGF, gluten porumb, tocătura de rapiță exrtahată, var  
furajer, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
AME găini	10.9 MJ/kg	Lizin	0.5 %
Poteine brută	15.5 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	3.6 %	Vitamina A	9 600.0 NE/kg
Fifre crudă	5.1 %	Vitamina D3	2 400.0 NE/kg
Cenușă brută	14.4 %	Vitamina E	40.0 m /kg
Na	0.15 %	Cu	5.1 mg/kg
Ca	3.9 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Intre săptămâna 32 și 52, după producția de vârf

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj broiler de start

Furaj complet

Numar articol: 935-210-00

**Greutate netă: 20 kg**

### Compoziție:

porumb furajer, tocătura de soia exrtahată, grâu furajer, făină de grâu furajeră, var furajer, MCP, energo-acid, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.8 %
AME găini	12.1 MJ/kg	Lizin	1.0 %
Poteine brută	20.9 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	4.6 %	Vitamina A	14 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.4 %	Vitamina D3	5 000.0 NE/kg
Cenușă brută	6.6 %	Vitamina E	50.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	17.6 mg/kg
Ca	1.0 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 % premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman  
Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul de start al puilor broier începând din ziua 1 pînă in ziua 10-12.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj broiler de creștere intensivă

Furaj complet

Numar articol: 935-220-00

Greutate netă: 20 kg

### Compoziție:

porumb furajer, tocătura de soia exrtahată, făină de grâu furajeră, tocătura de rapiță exrtahată, var furajer, energo-acid, MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
AME găini	12.0 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Poteine brută	19.3 %	Methionin	0.5 %
Grăsime brută	4.7 %	Vitamina A	14 000.0 NE/kg
Fife crudă	5.4 %	Vitamina D3	5 000.0 NE/kg
Cenușă brută	5.8 %	Vitamina E	50.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	14.6 mg/kg
Ca	0.8 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman  
Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul de creștere intensivă al puilor broiler incepând din ziua 12 pîna  
in ziua 35

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj broiler de incheiere intensivă

Furaj complet

Numar articol: 935-230-00

Greutate netă: 20kg

### Compoziție:

porumb furajer, tocătura de soia exrtahată, sulfat de soia, floarea soarelui extrahată, făină de grâu furajeră, var furajer, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.6 %
AME găini	12.0 MJ/kg	Lizin	0.8 %
Poteine brută	16.9 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	4.8 %	Vitamina A	12 000.0 NE/kg
Fifre crudă	4.6 %	Vitamina D3	3 000.0 NE/kg
Cenușă brută	7.2 %	Vitamina E	50.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	8.9 mg/kg
Ca	0.8 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul intensiv de incheiere al procesului de creștere al puilor broiler începând din ziua 35 pîna la tăiere

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj starter pentru păsări in sistem liber

Furaj complet

Numar articol: 935-010-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, grâu furajer, tocătura de soiă exrtahată, făină de grâu furajeră, tocătura de rapiță exrtahată, var furajer, MCP, preamestec, amino acid sintetic

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
AME găini	11.9 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Poteine brută	19.9 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	2.8 %	Vitamina A	14 000.0 NE/kg
Fifre crudă	3.5 %	Vitamina D3	5 000.0 NE/kg
Cenușă brută	5.9 %	Vitamina E	50.00 mg/kg
Na	0.14 %	Cu	17.2 mg/kg
Ca	1.0 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 % premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman  
Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru păsări in sistem liber din ziua al 1-a pînă in săptămâna al 3-lea, adăugare după pofta păsărilor.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de creștere pentru păsări in sistem liber

Furaj complet

Numar articol: 935-020-00

Greutate netă: 20kg

### Compoziție:

porumb furajer, tocătura de soiă exrtahată, făină de grâu furajeră,  
floarea soarelui extrahată, tocătura de rapiță exrtahată, tărâță de  
grâu, var furajer, MCP, preamestec, sare furajeră,  
amino acid sintetic

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	0.8	%
AME găini	11.2	MJ/kg	Lizin	0.7	%
Poteine brută	17.2	%	Methionin	0.4	%
Grăsime brută	3.3	%	Vitamina A	14.000.0	NE/kg
Fifre crudă	5.8	%	Vitamina D3	5 000.0	NE/kg
Cenușă brută	8.2	%	Vitamina E	50.0	mg/kg
Na	0.14	%	Cu	17.1	mg/kg
Ca	0.9	%	Robenidin	33.0	mg/kg

In furajul preperat este adăugat si produsul de medicină veterinară: Cycostat 6,6 %  
premix medical - Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758  
Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman  
Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru creșterea puilor in sistem liber începând din săptămâna al 3-  
lea pînă in săptămâna al 6-lea, adăugare după pofta păsărilor.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE



# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de incheiere pentru păsări in sistem liber

Furaj complet

Numar articol: 935-030-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compoziție:

porumb furajer, făină de grâu furajeră, floarea soarelui extrahată,  
tocătura de rapiță extrahată, CGF, var furajer, MCP,  
preamestec,

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
AME găini	11.4 MJ/kg	Lizin	0.6 %
Poteine brută	15.3 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	3.3 %	Vitamina A	9 600.0 NE/kg
Fifre crudă	6.0 %	Vitamina D3	2 400.0 NE/kg
Cenușă brută	7.8 %	Vitamina E	40.0 mg/kg
Na	0.13 %	Cu	5.2 mg/kg
Ca	0.7 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Furajul intensiv de incheiere al procesului de creștere al păsărilor in sistem liber începând din săptămâna al 6-lea pîna la tăiere, adăugare după pofta păsărilor.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj starter al gîscălor și al rațelor de curte

Furaj complet

Numar articol: 935-410-00

**Greutate netă: 20kg**

### Compozitie:

porumb furajer, tocătura de soia exrtahată, sulfat de soia, grâu furajer, faină de grâu furajeră, CGF, var furajer, MCP, preamestec,

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0	%	P	0.6	%
AME găini	11.9	MJ/kg	Lizin	1.1	%
Poteine brută	21.3	%	Methionin	0.3	%
Grăsime brută	3.7	%	Vitamina A	11 000.0	NE/kg
Fifre crudă	3.8	%	Vitamina D3	3 000.0	NE/kg
Cenușă brută	5.8	%	Vitamina E	25.0	mg/kg
Na	0.14	%	Cu	15.5	mg/kg
Ca	0.7	%			

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru gîscele și rațele de curte din ziua al 1-a pînă in săptămâna al 3-lea, adăugare după pofta păsărilor

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## **Amestec de furaj starter/ creștere al găscălor și al rațelor de curte**

**Furaj complet**

**Numar articol: 935-420-00**

**Greutate netă: 20kg**

### **Compoziție:**

porumb furajer, grâu furajer, soia extrahată, tocătura de floarea soarelui, tocătura de rapiță extrahată, tărâță de grâu, var furajer, MCP, preamestec, energo acid

### **CONȚINUT INTERN**

Umezeală	12.0 %	P	0.8 %
AME găini	11.3 MJ/kg	Lizin	0.7 %
Poteine brută	16.3 %	Methionin	0.3 %
Grăsime brută	3.6 %	Vitamina A	11 020.0 NE/kg
Fifre crudă	5.6 %	Vitamina D3	3 000.0 NE/kg
Cenușă brută	6.7 %	Vitamina E	25.0 mg/kg
Na	0.15 %	Cu	15.0 mg/kg
Ca	0.9 %		

### **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Pentru găsele și rațele de curte din săptămâna al 3-lea pînă tăiere, adăugare după pofta păsărilor

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**FURAJUL DIN PRIMA LINIE**

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj starter pentru curci cu kokcidiostaticum

Furaj complet

Numar articol: 935-510-00

Greutate netă: 20kg

### Compoziție:

tocătura de soia exrtahată, porumb furajer, sulfat de soia,  
faină de grâu furajeră, gluten porumb, var furajer,  
MCP, preamestec

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12 %	P	0.8 %
AME găini	11.6 MJ/kg	Lizin	1.5 %
Poteine brută	27.0 %	Methionin	0.7 %
Grăsime brută	4.6 %	Vitamina A	15 120.00 NE/kg
Fifre crudă	3.6 %	Vitamina D3	3 360.0 NE/kg
Cenușă brută	7.7 %	Vitamina E	56.00 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	16.9 mg/kg
Ca	1.3 %	Robenidin	33.0 mg/kg

In furajul preperat este adaugat si produsul de medicină veterinară:

Cycostat 6,6% premix medical

Număr de omologare: 375/1991. FVM,E 758

Materie: 33,0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman

Timpe de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru curcile de casă pînă in săptămâna 6-a

**Timpe de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de creștere pentru curci cu kokcidostaticum

Furaj complet

Numar articol: 935-520-00

Greutate netă: 20kg

### Compozitie:

porumb furajer, tocătura de soiă exrtahată, grâu furajer, tocătura de rapiță exrtahată, var furajer, MCP, preamestec, energo acid

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12 %	P	0.8 %
AME găini	12.1 MJ/kg	Lizin	1.2 %
Poteine brută	20.2 %	Methionin	0.5 %
Grăsime brută	3.8 %	Vitamina A	15 120.0 NE/kg
Fifre crudă	3.3 %	Vitamina D3	3 360.0 NE/kg
Cenușă brută	6.5 %	Vitamina E (a tokoferol)	56.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu (Cu-szulf.-p)	15.4 mg/kg
Ca	1.2 %	Robenidin,	33.0 mg/kg

In furajul preparat este adaugat si produsul de medicina veterinara:

Cycostat 6,6% premix medical

Numar de omologare: 375/1991. FVM,E 758

Materie: 33.0 mg/kg Robenidin

Atențiune: Nu se da animalelor care produc ouă de consum uman

Timp de asteptare sanitară: 5 zi

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru curcile de casă incepând din săptămâna 6 pînă in săptămâna 10.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de creștere pentru curci

Furaj complet

Numar articol: 935-530-00

Greutate netă: 20 kg

### Compoziție:

porumb furajer, floarea soarelui extrahată, tocătura de soia exrtahată,  
faină de grâu furajeră, tocătura de rapiță exrtahată,  
var furajer, MCP, preamestec, energo acid

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.8 %
AME găini	11.9 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Poteine brută	15.4 %	Methionin	0.4 %
Grăsime brută	4.6 %	Vitamina A	14 400.0 NE/kg
Fifre crudă	5.0 %	Vitamina D3	3 600.0 NE/kg
Cenușă brută	8.1 %	Vitamina E (a tokoferol)	60.0 mg/kg
Na	0.15 %	Cu (Cu-szulf.-p)	8.5 mg/kg
Ca	1.05 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru curcile de casă începând din săptămâna 11 pînă in  
săptămâna 15.

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra in locuri uscate și răcoroase

 **CENTRAL SOYA FEED KFT.**  
FURAJUL DIN PRIMA LINIE

# FURAJUL DIN PRIMA LINIE

2013



## Amestec de furaj de incheiere pentru curci

Furaj complet

Numar articol: 935-540-00

Greutate netă: 20kg

### Compoziție:

porumb furajer, grâu furajer, floarea soarelui extrahată, tocătura de soia extrahată, tocătura de rapiță extrahată, var furajer, MCP, preamestec, energo acid

### CONȚINUT INTERN

Umezeală	12.0 %	P	0.7 %
AME găini	11.6 MJ/kg	Lizin	1.0 %
Poteine brută	16.5 %	Methionin	0.6 %
Grăsime brută	3.3 %	Vitamina A	12 000.0 NE/kg
Fife crudă	5.3 %	Vitamina D3	3 000.0 NE/kg
Cenușă brută	7.8 %	Vitamina E	50.0 mg/kg
Na	0.16 %	Cu	8.9 mg/kg
Ca	1.02 %		

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru curcile de casă începând din săptămâna 16 pînă la tăiere

**Timp de garanție: 90 zile**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase



FURAJUL DIN PRIMA LINIE